


N° de Versión	1
Fecha de Aprobación	4-05- 2020
Fecha de Vigencia	4-05- 2021
Código	PR CI 1.2.1 COVID-19
Página	Página 1 de 17

# PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19

## PARA CIRUGÍA ELECTIVA, INYECCIONES Y LÁSER EN OFTALMOLOGÍA

### CI 1.2.1




ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 2 de 17

## INDICE

PREFACIO	3
1.-INTRODUCCIÓN	4
2.-OBJETIVO	5
3.-ALCANCE	5
4.-DESARROLLO	5
4.1.-Desición de Operar:	6
4.1.1.-Indicaciones al paciente:	6
4.1.2.-Tabla quirúrgica:	7
4.2.-Confirmación preoperatoria por COVID-19:	8
4.3.-Admisión general por COVID-19:	10
4.4.-Admisión Pabellón:	10
4.5.-Ingreso a pabellón:	11
4.6.-Durante la cirugía:	12
4.7-Recuperación	14
4.8.-Consentimiento informado	14
5.- MODIFICACIONES	15
6.-ANEXOS	15
6.1.-Consentimiento COVID-19 Clínica Pasteur	17
6.2.- Postura y retiro de EPP	18
7.-BIBLIOGRAFÍA	16


ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 3 de 17

## PREFACIO

Clínica Oftalmológica Pasteur como importante institución de salud privada en el ámbito de la oftalmología de nuestro país y, preocupada de la salud ocular de nuestros conciudadanos y pacientes, se ha autoimpuesto el deber de contribuir con su expertiz a fin de mitigar en lo que se pueda a esta grave condición mundial y ayudar con un granito de arena a aliviar la sin duda sobrecargada condición que viven y que vivirán aún más en algunas semanas nuestro Sistema Nacional de Servicios da Salud. De esta manera y agradeciendo de manera muy especial a todo el personal clínico y administrativo, que ha demostrado su temple y solidaridad en estos duros momentos que vive nuestro planeta, le solicitamos encarecidamente que lea en su totalidad este documento que define pormenorizadamente los pasos a seguir en la atención que brindaremos en las próximas semanas en relación a la cirugía electiva y procedimientos. Este es un documento de lectura obligatoria en su documento principal y en todos sus anexos y solo pretende que Clínica Pasteur pueda ayudar efectivamente en la atención oftalmológica de nuestro país y que no nos transformemos en el intento en un nuevo foco de contaminación.

Muchas gracias

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020


Cualquier modificación, copia o fotocopia a este documento queda totalmente PROHIBIDA

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 4 de 17

## 1.-INTRODUCCIÓN

Los pacientes sintomáticos con COVID-19 suelen presentar síntomas respiratorios, como fiebre, tos y disnea; otros síntomas incluyen rash, mialgias y trastornos gastrointestinales. La conjuntivitis también se ha notificado. Las complicaciones graves incluyen neumonía.

- El SARS-CoV-2 se transmite por aerosoles o gotitas respiratorias a la conjuntiva y vías respiratorias, pudiendo ser la conjuntivitis la primera manifestación de la infección sistémica.
- Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición y el periodo de incubación oscila entre 5-7 días con mayor frecuencia.
- En un estudio de Journal of Medical Virology de 30 pacientes hospitalizados por COVID-19 en China, uno tuvo conjuntivitis. Sólo éste tenía SARS-CoV-2 en sus secreciones oculares. Por tanto, el SARS-CoV-2 puede infectar la conjuntiva y causar conjuntivitis, y las partículas del virus están presentes en las secreciones oculares.
- En un estudio más amplio publicado en el New England Journal of Medicine, los investigadores documentaron “congestión conjuntival” en 9 de 1.099 pacientes (0,8%) con COVID-19 confirmado en laboratorio de 30 hospitales de China.
- Debido a su alta capacidad de transmisión es necesario guardar una distancia de seguridad de a lo menos 1,8 metros para reducir el riesgo de contagio.
- El área de oftalmología por el rango etario de sus pacientes es una de las más afectadas por esta contingencia debiendo implementar todas las medidas posibles a fin de resguardar la salud de sus pacientes.

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 5 de 17

## 2.-OBJETIVO


2.1.- Aplicar medidas de seguridad en la cirugía electiva, inyecciones y láser a fin de evitar contagios entre pacientes y funcionarios por COVID-19.

## 3.- ALCANCE:

3.1.-Médicos oftalmólogos, anestesistas, tecnólogos médicos de oftalmología, enfermeros de oftalmología, TENS y personal administrativo, que participe de cirugías electivas, inyecciones o láser.

## 4.-DESARROLLO

A los pocos días de detectarse los primeros casos de infección por SARS CoV 2 (Covid 19) en Chile, las autoridades de salud, así como varias de nuestras sociedades científicas, recomendaron la suspensión de cirugías electivas no prioritarias, con el objetivo principal de resguardar los recursos médicos ante una eventual necesidad masiva de estos. Sin embargo, dada la evolución de la pandemia en nuestro país, existen hospitales y centros de salud como Clínica Pasteur que reúnen las condiciones para reiniciar algunas cirugías electivas necesarias no urgentes pero que requieren ser realizadas dentro de un cierto límite de tiempo, a pesar de la pandemia COVID-19, tanto para controlar el daño emergente producto de la postergación del tratamiento quirúrgico como para evitar el incremento de las listas de espera, en un futuro cercano. Las instituciones, médicos y personal, deben estar preparados para satisfacer la demanda pospuesta y futura, con las debidas medidas que eviten riesgos tanto para los pacientes como para el personal de salud. El reinicio de esta cirugía electiva dependerá de las indicaciones específicas emanadas de la autoridad de salud correspondiente, tomando en consideración aspectos como reducción de número de

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020


<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 6 de 17

casos nuevos (durante un tiempo adecuado de observación) y disponibilidad de recursos hospitalarios (Camas UCIs, Ventiladores, EPP etc.). Las siguientes recomendaciones y principios son una guía para los equipos de salud para reiniciar, en forma segura, las cirugías electivas. Estas recomendaciones están definidas en una primera etapa de reinicio de intervenciones electivas y pueden variar, de acuerdo con el progreso y conocimiento de la pandemia.

#### 4.1.-Decisión de Operar:

**4.1.1.-Indicaciones al paciente:** Durante la consulta ambulatoria al momento de coordinar la cirugía, el médico deberá entregar al paciente la siguiente información en relación a las medidas de prevención institucionales frente al COVID-19:

- Indicar que la institución está tomando todas las medidas posibles para disminuir el riesgo de contagio para el paciente y los colaboradores razón por la cual:
  - Deberá realizarse un RT-PCR con a lo más 72 horas previas para toda cirugía electiva con y sin sedación, enviar los resultados vía email a [pvera@pasteur.cl-crojas@pasteur.cl-dcontreras@pasteur.cl](mailto:pvera@pasteur.cl-crojas@pasteur.cl-dcontreras@pasteur.cl), apenas obtenga los resultados. De salir positivo se suspenderá la cirugía y se informará a dirección médica y dirección de calidad.
  - Realizar la preadmisión ese mismo día.
  - Firmar consentimiento de COVID-19
  - Venir con a lo más un acompañante el día de su cirugía/procedimiento.
  - Guardar cuarentena desde el momento que se coordinó la cirugía y 7 días posterior a esta.

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 7 de 17


- Coordinar con su médico en los casos que se pueda controles postoperatorios por videoconferencia o call médico.

#### 4.1.2.-Tabla quirúrgica:

- Durante el modelo de consulta ambulatoria de 6x6 se podrán agendar como máximo 6 cirugías mayores, considerando 30 minutos de cirugía, 10 de limpieza entre cirugías y 40 minutos de colación.
- No existen módulos preferenciales para ningún médico, todas las cirugías son agendadas por orden de llegada de las solicitudes de pabellón y gestionadas por la coordinadora de pabellón. Para esto cada médico deberá solicitar sus pabellones a través de estas solicitudes y pabellón contar con el respaldo para justificar el orden de las asignaciones en día y horario de cada médico.
- Coordinadora de pabellón no podrá agendar pabellones a primer y segundo cirujano en horarios en el que estos tengan asignadas consultas ambulatorias.
- De atrasarse el primer cirujano más de 10 minutos se suspenderá su cirugía al final de la tabla o se reasignará para otro día de acuerdo a la disponibilidad.
- Los únicos criterios de priorización de pabellón serán los descritos en norma de pabellones generales tales como, pacientes pediátricos, que presenten alergias entre otros.


#### 4.2.-Confirmación preoperatoria por COVID-19:

- En caso de pacientes para cirugía electiva con y sin sedación 72 horas antes de la cirugía se le llamará a fin de:
  - Solicitar RT-PCR

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 8 de 17

- Aplicar cuestionario de detección de pacientes de riesgo por COVID-19, consignado la presencia o ausencia de los siguientes síntomas (encuesta epidemiológica):
  - Temperatura mayor a 37.8
  - Síntomas respiratorios
  - Dolor muscular
  - Tos
  - Dolor torácico
  - Diarrea
  - Polipnea
  - Alteración del gusto o el olfato
  - Contacto con pacientes sospechoso o positivo confirmado durante los últimos 14 días previos al procedimiento
- Solicitar que guarde cuarentena
- Que el día de su cirugía acuda con a lo más un acompañante.
- Realice su preadmisión, puede ser telefónicamente.
- Condiciones generales: IMC menor a 30 kg/m<sup>2</sup> y patologías crónicas compensadas (ASA I y II).
- En caso de pacientes para inyecciones, láser YAG y ARGÓN, el día anterior al procedimiento se le llamará a fin de:
  - Aplicar cuestionario de detección de pacientes de riesgo por COVID-19, consignado la presencia o ausencia de los siguientes síntomas (encuesta epidemiológica):

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020




<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 9 de 17

- Temperatura mayor a 37.8
  - Síntomas respiratorios
  - Dolor muscular
  - Tos
  - Dolor torácico
  - Diarrea
  - Polipnea
  - Alteración del gusto o el olfato
  - Contacto con pacientes sospechoso o positivo confirmado durante los últimos 14 días previos al procedimiento
- Solicitar que guarde cuarentena
  - Que el día de su cirugía acuda con a lo más un acompañante.
  - Realice su preadmisión, puede ser telefónicamente.
- Condiciones generales: IMC menor a 30 kg/m<sup>2</sup> y patologías crónicas compensadas (ASA I y II).

#### 4.3.-Admisión general por COVID-19:

- En admisión se deberá realizar el siguiente Check List consignado la presencia o ausencia de los siguientes síntomas (encuesta epidemiológica):
  - Temperatura mayor a 37.8
  - Síntomas respiratorios
  - Dolor muscular
  - Tos

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020


<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 10 de 17

- Dolor torácico
- Diarrea
- Polipnea
- Alteración del gusto o el olfato
- Contacto con pacientes sospechoso o positivo confirmado durante los últimos 14 días previos al procedimiento.

#### 4.4.-Admisión Pabellón:

- Solicitar RT-PCR en los casos de cirugías electivas con y sin sedación.
- Solicitar completado cuestionario preanéstésico
- En admisión pabellón se deberá realizar el siguiente Check List consignado la presencia o ausencia de los siguientes síntomas (encuesta epidemiológica):
  - Temperatura mayor a 37.8
  - Síntomas respiratorios
  - Dolor muscular
  - Tos
  - Dolor torácico
  - Diarrea
  - Polipnea
  - Alteración del gusto o el olfato
  - Contacto con pacientes sospechoso o positivo confirmado durante los últimos 14 días previos al procedimiento

#### 4.5.-Ingreso a pabellón:


ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestésista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 11 de 17

- Toma de temperatura corporal
- Entrega al paciente de sus EPP
- En la evaluación preanestésica debe quedar explícitamente consignado la presencia o ausencia de los siguientes síntomas (encuesta epidemiológica):
  - Temperatura mayor a 37.8
  - Síntomas respiratorios
  - Dolor muscular
  - Tos
  - Dolor torácico
  - Diarrea
  - Polipnea
  - Alteración del gusto o el olfato
  - Contacto con pacientes sospechoso o positivo confirmado durante los últimos 14 días previos al procedimiento

La presencia de cualquiera de estos síntomas contraindica la cirugía y obliga a derivar al paciente para descartar la infección mediante toma de muestra nuevamente de PCR y/o TAC de tórax (según indicación Minsal).

- Tratar de mantener el distanciamiento
- **EPP del personal de ingreso:**
  - **Mascarilla quirúrgica:** esta deberá ser reemplazada cada vez que se humedezca.
  - **Protector facial:** Deberá ser desinfectado en su cara externa entre cada paciente, su uso es permanente, personal e intransferible.


ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

N° de Versión	1
Fecha de Aprobación	4-05- 2020
Fecha de Vigencia	4-05- 2021
Código	PR CI 1.2.1 COVID-19
Página	Página 12 de 17

- **Delantal:** este deberá ser ocupado por TENS de ingreso retirado y cambiado por otro cada vez que ella abandone el área de ingreso por ejemplo para ir a almorzar.
- **Gorro:** este deberá ser ocupado por TENS de ingreso retirado y cambiado por otro cada vez que ella abandone el área de ingreso por ejemplo para ir a almorzar.

#### 4.6.-Durante la cirugía:

- **Equipo de protección personal al interior del quirófano para cirugías y procedimientos:**
  - **Mascarilla quirúrgica:** esta deberá ser reemplazada cada 4 horas.
  - **Protector facial:** Deberá ser desinfectado en su cara externa entre cada paciente, deberá ser utilizado por todo el personal al interior del quirófano salvo el cirujano. El cirujano y segundo cirujano, así como el anestesista cuando maneje aerosoles deberán utilizar antiparras.
  - **Delantal:** este deberá ser ocupado por TODO el equipo quirúrgico, retirado y cambiado por otro entre cada cirugía.
  - **Gorro:** este deberá ser ocupado por TODO el equipo quirúrgico.
  - **Guantes:** serán reemplazados entre pacientes por quienes los requieran.
- Mujeres pelo tomado sin pintura de uñas ni pulseras.
- Varones sin barba.
- Cirugías con anestesia general, ocupar respirador N95: para anestesista, TENS de anestesia y enfermero.


ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 13 de 17

- Aplicar en lista de chequeo consulta sobre:
  - Temperatura
  - Cuestionario
  - Consentimiento COVID-19
- Aseo con amonio cuaternario entre cirugía, desinfección de superficies, cables, máquinas, utensilios, camillas, sillas, lámparas, colirios, lápices ente otros.
- Lavado de manos de todo el equipo siempre antes y después de terminado una cirugía o un procedimiento.
- Eliminación de EPP: estos deben ser eliminados en los contenedores dispuestos en los quirófanos para este fin los cuales serán eliminados a través de la basura domiciliaria mediante doble bolsa.
- Personal de aseo de pabellón no podrá circular con traje clínico al interior de pabellón deberán colocarse delantal y al momento de salir retirárselo y luego al reingresar al pabellón colocarse uno distinto.

#### 4.7-Recuperación

- Considere la telesalud para los controles postoperatorios cuando sea apropiado y esté disponible para discusiones preoperatorias / posoperatorias y controles de heridas posoperatorias.
- Considere un período de aislamiento social postoperatorio de 7 días para reducir la incidencia de una nueva exposición e infección como sea posible, excluyendo las visitas postoperatorias necesarias.

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

N° de Versión	1
Fecha de Aprobación	4-05- 2020
Fecha de Vigencia	4-05- 2021
Código	PR CI 1.2.1 COVID-19
Página	Página 14 de 17

**NOTA: es obligación del personal de pabellón portan su mascarilla quirúrgica y protector facial en todas las etapas de atención del paciente.**

#### 4.8.- Consentimiento informado

- Es fundamental contar con un consentimiento informado específico, el que debe incluir información relacionada con el riesgo de contagio y las eventuales complicaciones. (Anexo 6.1)


#### 5.- MODIFICACIONES

SINTESIS MODIFICACIONES AL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN
1	4-05-2020	Documento nuevo

#### 6.-ANEXOS

6.1.- Consentimiento COVID-19 Clínica Pasteur

6.2.- Postura y retiro de EPP


ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

Cualquier modificación, copia o fotocopia a este documento queda totalmente PROHIBIDA

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 15 de 17

## 7.-BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Recomendaciones para reinicio de Cirugías Electivas en Pandemia CoVid19, Sociedad de anestesiología de Chile y sociedad de cirujanos de Chile.
- 2.- Considerations for the Resumption of Elective Surgery and Visits COVID-19, American Society of Plastic Surgeons.
- 3.-Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Opening Up America Again: Recommendations – Re-opening Facilities to Provide Non-emergent Non-COVID-19 Healthcare: Phase I, March 19, 2020, <https://www.cms.gov/files/document/covid-flexibility-reopen-essential-non-covid-services.pdf>.
- 3.- American College of Surgeons, COVID-19: Elective Case Triage Guidelines for Surgical Care, March 24, 2020, <https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case>.
- 4.- American College of Surgeons, COVID-19: Guidance for Triage of Non-Emergent Surgical Procedures, March 17, 2020, <https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/triage>.
- 5.- Prachand, V. N., Milner, R., Angelos, P., Posner, M. C., Fung, J. J., Agrawal, N., Jeevanandam, V., & Matthews, J. B. (2020). Medically-Necessary, Time-Sensitive Procedures: A Scoring System to Ethically and Efficiently Manage Resource Scarcity and Provider Risk During the COVID-19 Pandemic. Journal of the American College of Surgeons, S1072-7515(20)30317-3. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2020.04.011>
- 6.- American College of Gastroenterology.

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

<b>N° de Versión</b>	1
<b>Fecha de Aprobación</b>	4-05- 2020
<b>Fecha de Vigencia</b>	4-05- 2021
<b>Código</b>	PR CI 1.2.1 COVID-19
<b>Página</b>	Página 16 de 17

## ANEXOS 6.1.

### CONSENTIMIENTO INFORMADO POR COVID-19 PARA PROCEDIMIENTO/CIRUGÍA

NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE:

RUT DEL PACIENTE:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE SI LO HUBIERE:

RUT DEL REPRESENTANTE:

FECHA DE OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

DIAGNÓSTICO:

OJO: OD----- OI----- ODI-----

Declaro, en conformidad a lo señalado en la ley N.º 20.584 y lo dispuesto en el Decreto Supremo N°31 del Ministerio de Salud, del 15 de junio del 2012, haber recibido de parte del profesional que firma, información satisfactoria sobre mi cuadro clínico, características y objetivos del procedimiento, diagnóstico, tratamientos disponibles, pronósticos y las potenciales complicaciones o riesgos de la intervención.

Adicionalmente entiendo que estoy optando por un tratamiento / procedimiento / cirugía electiva que no es urgente y puede no ser médicamente necesario.

También entiendo que el nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Además, entiendo que COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se transmite por contacto de persona a persona; y, como resultado, el ministerio de salud recomienda el distanciamiento social. Reconozco que Clínica Pasteur está monitoreando de cerca esta situación y han implementado medidas preventivas razonables para reducir la propagación de COVID-19. Sin embargo, dada la naturaleza del virus, entiendo que existe un riesgo inherente de infectarse con COVID-19 en virtud de proceder con este tratamiento / procedimiento / cirugía electiva. Por la presente, reconozco y asumo el riesgo de infectarse con COVID-19 a través de este tratamiento / procedimiento / cirugía electiva, y doy mi permiso expreso para proceder con lo mismo.

Entiendo que, incluso si me hicieron la prueba de COVID y recibí un resultado negativo, las pruebas en algunos casos pueden no detectar el virus o puedo haber contraído COVID después de la prueba. Entiendo que, si tengo una infección por COVID-19, e incluso si no tengo ningún síntoma por lo mismo, proceder con este tratamiento / procedimiento / cirugía electiva puede dar lugar a una mayor probabilidad de complicaciones y muerte.


Por consiguiente, declaro expresamente haber entendido la información provista, habiendo tenido la oportunidad de formular preguntas y dudas respecto a las variables señaladas en el párrafo anterior, las que han sido contestadas y aclaradas a mi entera satisfacción.

Por lo anteriormente expuesto doy mi consentimiento en forma libre, voluntaria, expresa e informada para ser sometido(a) al procedimiento/ cirugía de.....

Así mismo, consiento en toda maniobra que el equipo de profesionales considere necesarias de implementar para el caso que ocurrieren situaciones no esperadas o complicadas, y/o traslado a otro centro de ser necesario.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, RUT Y FIRMA  
PACIENTE O REPRESENTANTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, RUT Y FIRMA  
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestésista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

Cualquier modificación, copia o fotocopia a este documento queda totalmente PROHIBIDA



N° de Versión	1
Fecha de Aprobación	4-05- 2020
Fecha de Vigencia	4-05- 2021
Código	PR CI 1.2.1 COVID-19
Página	Página 17 de 17

## ANEXO 6.2 Postura y retiro de EPP

# COVID-19

### Enfermedad por coronavirus 2019

#### CÓMO PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**PASO 1**

- Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.
- Vea dónde se pondrá y quitará el EPP.
- Pida ayuda a un amigo o póngase delante de un espejo.
- Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.

**PASO 2** Póngase la bata.

**PASO 3** Póngase la mascarilla quirúrgica o respirador.\*

**PASO 4** Póngase la protección ocular (gafas protectoras) o facial (protector facial).†

**PASO 5** Póngase los guantes (incluso sobre la muñeca).

\*Puede ser una mascarilla quirúrgica o un respirador (N95 o similar), según el nivel de atención.  
En el procedimiento generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).  
†Por ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempañante o un líquido antiempañante).

#### CÓMO QUITARSE EL EPP

- Evite la contaminación para usted mismo, los demás y el entorno.
- Quítese primero los elementos más contaminados.

**PASO 1** Quítese los guantes y luego la bata.

**PASO 2** Higienícese las manos.

**PASO 3** Quítese la protección ocular, desde atrás hacia adelante.

**PASO 4** Quítese la mascarilla quirúrgica o respirador, desde atrás hacia adelante.

**PASO 5** Higienícese las manos.

Nivel de atención	Higiene de las manos	Bata	Mascarilla quirúrgica	Respirador (N95 o similar)	Gafas protectoras (protección ocular) o protección de cara (protección facial)	Guantes
Triaje						
Recogida de muestras para diagnóstico de laboratorio						
Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud, pero no requiere ningún procedimiento generador de aerosoles						
Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles†						

†Los procedimientos que generan aerosoles comprenden la ventilación con presión positiva (sistema de bipresión positiva o sistema de presión positiva continua), intubación endotraqueal, aspiración de las vías respiratorias, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueotomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizador, inducción del espasmo, broncoscopia y neopresia.

**OPS** Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud

Conócelo. Prepárate. Actúa.  
www.paho.org/coronavirus

ELABORADO	APROBADO Y ACTUALIZADO
TM. Contreras, Denisse (Calidad y Seguridad) Dr. García, Rodrigo (Director Médico) Dr. Gonzalez, Germán (Oftalmólogo) Dr. Redondo, Jorge (Anestesiista) EU. Rojas, Carolina (Pabellón) Clínica Pasteur	 Dr. Rodrigo García Castelblanco Director Médico Clínica Pasteur
30-04-2020	04-05-2020

Cualquier modificación, copia o fotocopia a este documento queda totalmente PROHIBIDA